



Madame,

Votre médecin vous a prescrit un prélèvement vaginal à la recherche de germes dits classiques et/ou à la recherche de *Chlamydia*. Nous vous proposons d'effectuer ce prélèvement vous-même avec le matériel que nous vous avons remis. Merci de suivre attentivement les instructions suivantes afin d'assurer la qualité et la fiabilité de vos résultats.

1. Lavez-vous les mains.

2. Veuillez suivre les étapes 2 à 10 avec le matériel qui vous a été remis.

En cas de recherche associée de germes classiques et de PCR Chlamydia/gonocoque, suivez les étapes 2 à 9 d'abord avec le milieu pour germes classiques (bouchon rose), puis répétez-les avec le milieu pour Chlamydia/gonocoque (bouchon blanc BDMax UVE).

Ouvrir le haut du sachet contenant l'écouvillon sans toucher le coton. Figure 1 Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demandez un nouveau kit de prélèvement.

3. Tenez l'écouvillon en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige. Figure 1

4. Prenez la position que l'on utilise pour mettre un tampon, écartez les grandes lèvres et introduire l'écouvillon sur une distance d'environ 3 cm et tournez doucement l'écouvillon pendant 10-30 secondes, en touchant bien les parois vaginales. Figure 2

5. Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.

6. Tout en tenant l'écouvillon par la tige, enlever le bouchon du tube (attention à ne pas renverser son contenu).

7. Placer immédiatement l'écouvillon dans le tube (coton dans le liquide).

8. Casser la tige de l'écouvillon en la pressant contre le bord du tube Figure 3

9. Revisser fermement le bouchon sur le tube. Figure 4

10. Identifier le tube avec votre nom, prénom et date de naissance ; date et heure de prélèvement. Le placer dans le sachet plastique fourni.

Conserver à température ambiante et apporter au laboratoire dans les 24 heures



Figure 1



Figure 2




Figure 3



Figure 4

Le laboratoire est à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.